

ACTIVIDAD 1


Curso : Quinto de Secundaria

DINÁMICA SEGUNDA LEY DE NEWTON

Jorge Cabrera


PROBLEMAS DEL TIPO A

1. Sobre un cuerpo de 10 kg actúan dos fuerzas perpendiculares 3 [N] y 4 [N]. Halla aceleración que experimenta el cuerpo.




- A) 0,1 [m/s^2]
B) 0,3 [m/s^2]
C) 0,5 [m/s^2]
D) 0,7 [m/s^2]
E) NA.

2. Sobre un cuerpo de 250 [g] actúan dos fuerzas de 3[N] y 4[N]. Calcular la aceleración que experimenta el cuerpo si las fuerzas forman un de 120°., $m = 0,25[\text{kg}]$




- A) 14,2 [m/s^2]
B) 14,4 [m/s^2]
C) 14,6 [m/s^2]
D) 14,8 [m/s^2]
E) NA.

3. Sobre un cuerpo de 26 kg actúan dos fuerzas perpendiculares 5 [N] y 12 [N]. Halla la aceleración que experimenta el cuerpo.




- A) 0,1 [m/s^2]
B) 0,3 [m/s^2]
C) 0,5 [m/s^2]
D) 0,7 [m/s^2]
E) NA.

4. Sobre un cuerpo de 12,3 kg actúan dos fuerzas de 8[N] y 5[N]. Calcular la aceleración que experimenta el cuerpo si las fuerzas forman un ángulo de 130°.




- A) 0,48 [m/s^2]
B) 0,50 [m/s^2]
C) 0,52 [m/s^2]
D) 0,54 [m/s^2]
E) NA.

5. Hallar la aceleración que experimenta el cuerpo.
 $m = 4 \text{ kg}$.




- A) 1,66 [m/s^2]
B) 1,68 [m/s^2]
C) 1,70 [m/s^2]
D) 1,72 [m/s^2]
E) NA.

10. Calcula la aceleración, si el cuerpo tiene una masa $m = 5 \text{ kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
B) 2 [m/s^2]
C) 3 [m/s^2]
D) 4 [m/s^2]
E) NA.

11. Calcular la aceleración del cuerpo, $m = 12 \text{ kg}$.




- A) 5,1 [m/s^2]
B) 5,3 [m/s^2]
C) 5,5 [m/s^2]
D) 5,7 [m/s^2]
E) NA.

12. Hallar la aceleración del bloque, si su masa es 4[kg].




- A) 1 [m/s^2]
B) 2 [m/s^2]
C) 3 [m/s^2]
D) 4 [m/s^2]

13. Hallar la aceleración del bloque.




- A) 1 [m/s^2]
B) 2 [m/s^2]
C) 3 [m/s^2]
D) 4 [m/s^2]
E) NA.

14. Hallar la aceleración del bloque.




- A) 2 [m/s^2]
B) 3 [m/s^2]
C) 4 [m/s^2]
D) 5 [m/s^2]
E) NA.

15. A partir del sistema dinámico, calcula la fuerza "F".




- A) 34 [N]
B) 35 [N]
C) 36 [N]
D) 37 [N]
E) NA.

16. Halla la fuerza "F". Si $m=4 \text{ kg}$.




- A) 23 [N]
- B) 22 [N]
- C) 21 [N]
- D) 20 [N]
- E) NA.

17. Hallar la aceleración del bloque. Si $m = 4 \text{ kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

18. Hallar la aceleración del bloque.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

19. Halla la aceleración del bloque.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

20. Halla la aceleración del bloque.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

21. Calcula la masa del cuerpo.




- A) 1 [kg]
- B) 2 [kg]
- C) 3 [kg]
- D) 4 [kg]
- E) NA.

22. Calcula la fuerza "F". Si $m=8 \text{ [kg]}$.




- A) 41 [N]
- B) 40 [N]
- C) 39 [N]
- D) 38 [N]
- E) NA.

23. Halla la aceleración del bloque. Si su masa 3 kg.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

24. Halla la aceleración del blque, Si $m=2\text{kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

25. Halla la aceleración del blque, Si $m=5\text{kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

26. Halla la aceleración del bloque. Si $m=3 \text{ kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

27. Halla la aceleración del bloque. Si $m = 4 \text{ kg}$.




- A) 1,2 [m/s^2]
- B) 1,4 [m/s^2]
- C) 1,6 [m/s^2]
- D) 1,8 [m/s^2]
- E) NA.

28. Halla la aceleración del bloque. Si $m = 4 \text{ kg}$.




- A) 1 [m/s^2]
- B) 2 [m/s^2]
- C) 3 [m/s^2]
- D) 4 [m/s^2]
- E) NA.

29. Halla la aceleración del bloque. Si $m = 10 \text{ kg}$.




- A) 0,1 [m/s^2]
- B) 0,2 [m/s^2]
- C) 0,3 [m/s^2]
- D) 0,4 [m/s^2]
- E) NA.

30. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=5 \text{ [kg]}$.




- A) 1 $[\text{m/s}^2]$
- B) 2 $[\text{m/s}^2]$
- C) 3 $[\text{m/s}^2]$
- D) 4 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

31. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=2 \text{ [kg]}$.




- A) 7 $[\text{m/s}^2]$
- B) 8 $[\text{m/s}^2]$
- C) 9 $[\text{m/s}^2]$
- D) 10 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

32. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=4 \text{ [kg]}$.




- A) 1 $[\text{m/s}^2]$
- B) 2 $[\text{m/s}^2]$
- C) 3 $[\text{m/s}^2]$
- D) 4 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

33. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=5 \text{ [kg]}$.




- A) 1 $[\text{m/s}^2]$
- B) 2 $[\text{m/s}^2]$
- C) 3 $[\text{m/s}^2]$
- D) 4 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

34. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=10 \text{ [kg]}$.




- A) 3 $[\text{m/s}^2]$
- B) 5 $[\text{m/s}^2]$
- C) 7 $[\text{m/s}^2]$
- D) 9 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

35. Hallar la aceleración del bloque. Si $m=10 \text{ [kg]}$.



- A) 1 $[\text{m/s}^2]$
- B) 2 $[\text{m/s}^2]$
- C) 3 $[\text{m/s}^2]$
- D) 4 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.


36. Hallar la aceleración del cuerpo. Si $m = 2 \text{ kg}$.



- A) 3 $[\text{m/s}^2]$
- B) 4 $[\text{m/s}^2]$
- C) 5 $[\text{m/s}^2]$
- D) 6 $[\text{m/s}^2]$
- E) NA.

37. Del techo de un ascensor cuelga un cuerpo de 5 kg.


Calcular la tensión en la cuerda si el ascensor asciende con una aceleración constante de 2 $[\text{m/s}^2]$.



- A) 40 [N]
- B) 50[N]
- C) 60[N]
- D) 70[N]
- E) NA.


38. Del techo de un ascensor cuelga un cuerpo de 5 kg.

Calcular la tensión en la cuerda si el ascensor desciende con una aceleración constante de 2 $[\text{m/s}^2]$.




- A) 40 [N]
- B) 50[N]
- C) 60[N]
- D) 70[N]
- E) NA.

39. Determinar la lectura de la báscula (balanza), si la persona tiene una masa de 70 [kg] y el ascensor baja con aceleración constante de 1,5 $[\text{m/s}^2]$.




- A) 395 [N]
- B) 590[N]
- C) 450[N]
- D) 595[N]
- E) NA.

40. Determinar la lectura de la báscula (balanza), si la persona tiene una masa de 70 [kg] y el ascensor sube con aceleración constante de 1,5 $[\text{m/s}^2]$.




- A) 803 [N]
- B) 804[N]
- C) 805[N]
- D) 806[N]
- E) NA.

41. El ascensor sube con aceleración constante de 5 m/s^2 si la masa del bloque es 5 [kg], la deformación del resorte es 0,5 [m]. Hallar el valor de K.




- A) 50 [N/m]
- B) 100[N/m]
- C) 150[N/m]
- D) 200[N/m]
- E) NA.

42. El ascensor baja con aceleración constante de 5 m/s^2 si la masa del bloque es 5 [kg], la deformación del resorte es 0,5 [m]. Hallar el valor de K.




- A) 50 [N/m]
- B) 100[N/m]
- C) 150[N/m]
- D) 200[N/m]
- E) NA.

43. Calcular la deformación del resorte. Si $m=8\text{kg}$
 $a = 2[\text{m/s}^2]$ y $K= 4[\text{N/cm}]$.




- A) 2 [cm]
- B) 4 [cm]
- C) 6 [cm]
- D) 8 [cm]
- E) NA.

44. Calcular la deformación del resorte.
 $k = 32 \text{ [N/cm]}$.




- A) 0,4 [cm]
- B) 0,5 [cm]
- C) 0,6 [cm]
- D) 0,7 [cm]
- E) NA.

45. Calcular la fuerza "F".




- A) 160 [N]
- B) 170[N]
- C) 180[N]
- D) 200[N]
- E) NA.

46. Calcula la fuerza "F". Si $V_A=10[\text{m/s}]$; $V_B=30[\text{m/s}]$;
 $d_{AB}= 80 \text{ [m]}$; $m = 20 \text{ [kg]}$.




- A) 50 [N]
- B) 100[N]
- C) 150[N]
- D) 200[N]
- E) NA.

47. Calcula la fuerza "F". Si $V_A=10[\text{m/s}]$; $V_B=30[\text{m/s}]$;
 $t_{AB}= 40 \text{ [s]}$; $m = 20 \text{ [kg]}$.




- A) 5 [N]
- B) 10[N]
- C) 15[N]
- D) 20[N]
- E) NA.

48. Calcula la fuerza "F". Si $V_A=0[\text{m/s}]$; $d_{AB}= 36[\text{m}]$;
 $t_{AB}= 6 \text{ [s]}$; $m = 8 \text{ [kg]}$.



- A) 4 [N]
- B) 8[N]
- C) 12[N]
- D) 16[N]
- E) NA.

49. ¿Qué fuerza ha debido ejercer un motor de un automóvil cuya masa es 1 500 [kg] , para aumentar su velocidad de 10 [m/s] a 50 [m/s] en 5 [s] ?



- A) 12 [KN]
- B) 14[KN]
- C) 16[KN]
- D) 18[KN]
- E) NA.

50. Una motocicleta cuya masa es de 400 [kg] alcanza una velocidad de 90 km/h al cabo de 5 [s] de haber arrancado .¿ Cuál es el valor de la fuerza que ejerce el motor de la motocicleta ?



- A) 1 [KN]
- B) 2[KN]
- C) 3[KN]
- D) 4[KN]
- E) NA.

51. Se aplica una fuerza horizontal de 10[N] a un cuerpo de 2 [kg] con una velocidad inicial de 20 m/s, calcula la velocidad del cuerpo después de 8 [s].

- A) 10 [m/s]
- B) 20[m/s]
- C) 40[m/s]
- D) 60[m/s]
- E) NA.

PROBLEMAS DEL TIPO B

1. Calcular la tensión de la cuerda.




- A) 7[N]
B) 8[N]
C) 9[N]
D) 10[N]

2. Calcular la fuerza de contacto entre los bloques.




- A) 5[N]
B) 10[N]
C) 15[N]
D) 20[N]

3. Calcular la aceleración del sistema.




- A) 2[m/s²]
B) 3[m/s²]
C) 4[m/s²]
D) 5[m/s²]
E) NA.

4. Calcular la aceleración del sistema.



- A) 2,3[m/s²]
B) 2,5[m/s²]
C) 2,7[m/s²]
D) 2,9[m/s²]
E) NA.


5. Calcular la tensión "T" de la cuerda



- A) 7[N] B) 8[N] C) 9[N] D) 10[N] E) NA.


6. Calcular la fuerza de contacto entre m₁ y m₂.

$$m_1=6[\text{kg}] ; m_2=1[\text{kg}] ; m_3 = 3[\text{kg}].$$




- A) 10[N] B) 11[N] C) 12[N] D) 13[N] E) NA.

7. Halla la tensión de la cuerda que une los bloques.




- A) 38[N] B) 34[N] C) 38[N] D) 40[N] E) NA.

8. Halla la aceleración de los bloques.




- A) 1 [m/s²] B) 2 [m/s²] C) 4 [m/s²] D) 6 [m/s²]

9. ¿Cuál es la aceleración del sistema?




- A) 2[m/s²]
B) 3[m/s²]
C) 4[m/s²]
D) 5[m/s²]
E) NA.

10. Halla la aceleración de cada bloque.




- A) 2[m/s²]
B) 4[m/s²]
C) 5[m/s²]
D) 6[m/s²]
E) NA.

11. Halla la tensión T₁.



- A) 10[N] B) 11[N] C) 12 [N] D) 13[N] E) NA:


12. Halla la aceleración del sistema.



- A) 2[m/s²]
B) 4[m/s²]
C) 6[m/s²]
D) 8[m/s²]
E) NA.


PROBLEMAS DEL TIPO C

1. Hallar la aceleración del bloque, si su masa es 4[kg]. Coeficiente de rozamiento 0,2




- A) 1 [m/s²]
B) 2 [m/s²]
C) 3 [m/s²]
D) 4 [m/s²]
E) NA.

2. Hallar la aceleración del bloque, si su masa es 6[kg]. Coeficiente de rozamiento 0,4.




- A) 1 [m/s²]
B) 2 [m/s²]
C) 3 [m/s²]
D) 4 [m/s²]
E) NA.

3. Hallar la aceleración del bloque, si su masa es 8[kg]. Coeficiente de rozamiento 0,4.



- A) 2,3 [m/s²]
B) 2,5 [m/s²]
C) 2,7 [m/s²]
D) 2,9 [m/s²]
E) NA.

4. Hallar la aceleración del bloque, si su masa es 4[kg]. Coeficiente de rozamiento 0,2.




- A) 0,3 [m/s²]
B) 0,4 [m/s²]
C) 0,5 [m/s²]
D) 0,6 [m/s²]
E) NA.

5. Calcular la tensión de la cuerda. Si $\mu = 0,4$.




- A) 12[N]
B) 14[N]
C) 16[N]
D) 18[N]
E) NA.

6. Calcular la fuerza de contacto entre los bloques.
Si $\mu = 0,6$




- A) 32[N]
B) 34[N]
C) 36[N]
D) 38[N]
E) NA.

7. Halla la aceleración del sistema. Si $\mu = 0,4$.




- A) 4,4 [m/s²]
B) 4,6 [m/s²]
C) 4,8 [m/s²]
D) 5,0 [m/s²]
E) NA.

8. Halla la aceleración del sistema. Si $\mu = 0,2$




- A) 2 [m/s²]
B) 4 [m/s²]
C) 6 [m/s²]
D) 8 [m/s²]
E) NA.

9. Halla la aceleración del sistema. Si $\mu = 0,2$




- A) 4,5 [m/s²]
B) 4,6 [m/s²]
C) 4,7 [m/s²]
D) 4,8 [m/s²]
E) NA.

10. Halla la aceleración del sistema. Si $\mu = 0,4$



- A) 5,2 [m/s²]
B) 5,4 [m/s²]
C) 5,6 [m/s²]
D) 5,8 [m/s²]
E) NA.

11. Halla la aceleración del sistema. Si $\mu = 0,4$



- A) 5,90 [m/s²]
B) 5,92 [m/s²]
C) 5,94 [m/s²]
D) 5,96 [m/s²]
E) NA.

12. ¿Qué tiempo deberá actuar una fuerza de 80 [N] sobre un cuerpo cuya masa es de 10 kg para lograr detenerlo si posee una velocidad de 72 km/h ?

- A) 2,0[s]
B) 1,5[s]
C) 2,5[s]
D) 3,0[s]
E) NA: